

12


choses à
savoir sur
le paludisme



Organisation
mondiale de la Santé



Près de la **1/2** de la population mondiale est menacée




La région africaine de
l'OMS représentait

94%



des **249 millions** de
cas de paludisme
dans le monde en 2022

Le risque de transmission
est **le plus élevé** pendant
la saison des pluies





Malaria is
preventable
and curable



World Health
Organization

Les symptômes du paludisme sont les suivants:

- fièvre
- frissons
- faiblesse
- symptômes grippaux


Consultez un médecin si vous présentez des symptômes de paludisme



Organisation
mondiale de la Santé

Vérifiez avec votre prestataire de santé local comment **prévenir ou traiter** une infection dans la région où vous vivez ou voyagez





Le temps est un facteur essentiel dans la détection et le traitement du paludisme.

Demandez à votre prestataire de santé local **un test de diagnostic rapide du paludisme**, qui est simple à réaliser et donne des résultats rapides.



Organisation mondiale de la Santé

Mettre en œuvre les stratégies existantes

Il est urgent d'utiliser plus efficacement les outils et les stratégies disponibles pour prévenir, diagnostiquer et traiter le paludisme.


En particulier pour les personnes les plus vulnérables



Organisation
mondiale de la Santé

Intensifier l'innovation


Joignez-vous à ceux qui réclament des outils novateurs pour lutter contre le paludisme. En particulier pour les populations **marginalisées et difficiles à atteindre**



Organisation
mondiale de la Santé



Investir dans la lutte contre le paludisme



Les financements doivent être accordés en priorité aux personnes **les plus vulnérables:**

- Moins d'accès aux services
- Plus durement affectés en cas de maladie



Organisation mondiale de la Santé

Les nourrissons et les jeunes enfants connaissent encore la charge de mortalité la plus élevée : en 2022, dans la Région africaine, 4 décès sur 5 dus au paludisme concernaient des enfants de moins de 5 ans.

Les enfants de moins de 5 ans des ménages les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne ont 5 fois plus de risque d'être infectés par le paludisme que les autres.

En octobre 2023, l'OMS a mis à jour sa recommandation concernant les vaccins antipaludiques. La recommandation actualisée s'applique aux vaccins RTS, S et R21.



Organisation
mondiale de la Santé



La grossesse réduit l'immunité d'une femme au paludisme, ce qui accroît le risque d'infection et de maladie grave, ainsi que de décès.

S'il n'est pas traité, le paludisme pendant la grossesse peut provoquer une anémie sévère, le décès maternel, la mortinaissance, l'accouchement prématuré et l'insuffisance pondérale à la naissance.



Organisation
mondiale de la Santé